

**КАРТА ПАЦИЕНТА****Вальпроевая кислота (препараты МИРОДЕП® лонг, МИРОДЕП®): контрацепция и меры по предотвращению беременности****Что Вам необходимо делать:**

- Не прекращайте приём вальпроевой кислоты, если только Ваш врач не сказал Вам это сделать, так как Ваше состояние может ухудшиться.
- При планировании беременности не прекращайте приём вальпроевой кислоты или использование средств контрацепции до консультации с врачом.
- Если есть вероятность наступления беременности, не прекращайте приём вальпроевой кислоты без указания врача. Срочно обратитесь к врачу для обсуждения дальнейших действий.
- Внимательно прочитайте инструкцию по медицинскому применению или листок-вкладыш перед использованием.
- Ознакомьтесь с брошюрой для пациента.

**Храните эту карточку при себе, чтобы всегда знать, как действовать.****КАРТА ПАЦИЕНТА****Вальпроевая кислота (препараты МИРОДЕП® лонг, МИРОДЕП®): контрацепция и меры по предотвращению беременности****Информация для всех девочек и женщин, принимающих вальпроевую кислоту и имеющих возможность забеременеть:**

- Вальпроевая кислота – эффективное средство для лечения эпилепсии и биполярного расстройства;
- Вальпроевая кислота может нанести серьёзный вред нерождённому ребёнку при приёме во время беременности и привести к пожизненной инвалидности;
- Используйте надёжный метод контрацепции постоянно на протяжении всего лечения вальпроевой кислотой;
- Важно обсуждать и пересматривать Ваше лечение с врачом не реже одного раза в год.

**Информация для всех мальчиков и мужчин, принимающих вальпроевую кислоту и имеющих способность к зачатию:**

- Существует возможный риск нарушений нейроразвития у ребёнка, если отец принимал вальпроевую кислоту в течение трёх месяцев до зачатия;
- Обсудите этот возможный риск и необходимость применения эффективной контрацепции для Вас и Вашей партнёрши с Вашим лечащим врачом.