

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Лоролизин

наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер: ЛП-005922

Торговое наименование: Лоролизин

Группировочное наименование: лизоцим + пиридоксин

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на 1 таблетку

Действующие вещества:

Лизоцима гидрохлорид 20,0 мг

Пиридоксина гидрохлорид 10,0 мг

Вспомогательные вещества:

Лактозы моногидрат 155,4 мг

Камедь Астрагала трагакантового 10,0 мг

Магния стеарат 4,0 мг

Натрия сахаринат 0,5 мг

Ванилин 0,1 мг

Описание: круглые таблетки белого или желтовато-белого цвета с риской на одной стороне и фаской с двух сторон. Возможно наличие темных вкраплений.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: [R02AA20]

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Лизоцим является ферментом белковой природы, оказывает антисептическое действие вследствие прямого воздействия на грамположительные и, в меньшей степени, на грамотрицательные бактерии, а также грибы и вирусы; принимает участие в регуляции местного неспецифического иммунитета.

Пиридоксин оказывает защитное действие на слизистую оболочку полости рта (оказывает антиафтозный эффект). Не влияет на фармакодинамические свойства лизоцима.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, десен и гортани: гингивит, стоматит, катаральные явления в верхних отделах дыхательных путей, афтозные изъязвления, герпетические поражения (в составе комплексной терапии), эрозии слизистой оболочки полости рта любой этиологии.

Противопоказания

Гиперчувствительность, детский возраст до 3 лет.

Наследственная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат может применяться во время беременности и периода кормления грудью.

Способ применения и дозы

Препарат применяется местно.

Таблетки следует медленно рассасывать, не разжевывая, задерживая растаявшую массу таблетки в полости рта как можно дольше (вплоть до полного растворения).

Детям в возрасте 3-7 лет обычно назначают по 1 таблетке 3 раза

в сутки, 7-12 лет – по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Взрослым и детям старше 12 лет – по 2 таблетки 3-4 раза в сутки.

Длительность лечения – до 8 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы передозировки маловероятны, могут отмечаться после применения в дозах, значительно превышающих терапевтические, и проявляться чувством онемения, ощущением покалывания, а также нарушением чувствительности в области верхних и нижних конечностей.

Лечение: обильное питье (форсированный диурез).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие антибиотиков, в том числе бета-лактамов, хлорамфеникола, нитрофурантоина, усиливает действие диуретиков, ослабляет активность леводопы. Изониазид, пеницилламин, пиразинамид, иммуносупрессоры, эстрогены и пероральные контрацептивы могут усиливать потребность в пиридоксине (антагонистическое действие по отношению к пиридоксину или увеличение ренальной экскреции).

Особые указания

В случае появления аллергических реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять автотранспортом или работать с механизмами

Не влияет на скорость психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания, 20 мг + 10 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной/поливинилиденхлоридной и фольги

алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (контурная ячейковая упаковка в пачке) при температуре не выше 30 °С.

Срок годности

3 года.

Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «БРАЙТФАРМ», Россия
249033, Калужская область, г. Обнинск, ул. Горького, д. 4
Тел/факс: (495) 984-28-40/41
e-mail: life-sciences@yandex.ru

Производитель

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» (ЗАО «ОХФК»), Россия.

Адрес места производства: Калужская обл., г.о. «Город Обнинск», г. Обнинск, Киевское шоссе, зд. За, стр. 3;

Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, зд. 107.

Тел./факс: (484) 399-38-41, (484) 399-38-42;

e-mail: obninsk@mirpharm.ru.